



Tous les produits de contraste utilisés en radiologie sont généralement bien tolérés mais sont cependant susceptibles de pouvoir entraîner des effets indésirables.

Il s'agit le plus généralement de manifestations bénignes :

- nausées, vomissements
- éruptions cutanées urticariennes
- prurit

Il peut apparaître des problèmes loco-régionaux au niveau du point de ponction :

- plaie veineuse ou hématome
- extravasation du produit de contraste
- complication infectieuse secondaire à la ponction

Plus rarement, il peut s'agir de réactions plus prononcées :

- Dyspnée
- Oedème laryngé ou pulmonaire
- Oedème de Quincke
- Crise de tétanie
- Troubles cardio-vasculaires avec troubles du rythme voir collapsus cardio-vasculaire pouvant exceptionnellement aller jusqu'à l'arrêt cardiaque.

La conduite de véhicule ou l'utilisation de machines est déconseillée dans l'heure qui suit l'injection.

De par la loi, c'est au médecin de fournir la preuve qu'il vous a informé(e) des risques inhérents à cet examen, nous vous prions donc de bien vouloir répondre au questionnaire et signer cette feuille avant votre examen.

**Je reconnais avoir été informé(e) des risques potentiels encourus par la réalisation de l'examen pratiqué ce jour.**

**Signature du patient**

**réservé au personnel soignant**

Date de l'examen : <<DateLong(@jour)>>

Nature de l'examen : .....

Produit de contraste utilisé : .....

N° de lot : ..... Dose injectée : .....ml

Créatinine : ..... mg/l date : .....

Clairance : .....ml/mn C&G MDRD CKD-EPI

Nom et signature du médecin : .....